

Los otros vientos olvidados en la cima de Tenerife

LOS CONTRALISIOS

Frecuencias relativas mensuales de las direcciones del viento independiente de sus intensidades

- *Tabla 1. - La Rambleta del Teide, serie temporal 2015 – 2018*

La serie anemométrica presenta notables ausencias. Serie temporal discontinua

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
ENERO	19.7	21.5	10.0	6.0	9.1	15.4	9.7	8.6
FEBRERO	33.0	15.6	4.6	5.2	6.1	12.9	10.6	12.1
MARZO	16.9	15.6	5.4	6.5	7.3	10.3	16.9	21.1
ABRIL	13.6	5.3	2.0	3.2	7.3	17.2	33.8	17.6
MAYO	13.9	4.7	5.2	5.9	7.7	17.2	24.9	20.5
JUNIO	9.9	7.5	3.9	6.7	11.3	19.5	23.3	17.9
JULIO	13.9	11.5	7.6	8.7	14.5	16.1	16.5	11.2
AGOSTO	10.9	6.3	6.4	10.7	17.2	22.4	15.4	10.6
SEPTIEMBRE	9.6	7.0	5.6	5.4	10.2	24.7	22.0	15.6
OCTUBRE	5.2	8.4	3.7	4.6	8.9	31.3	22.2	15.6
NOVIEMBRE	10.1	15.7	8.4	8.0	9.8	21.0	15.1	12.0
DICIEMBRE	13.9	26.6	11.3	7.9	6.7	17.3	9.0	7.2

Serie temporal anemométrica de pocos años en la cima de la isla. Las cuantías de frecuencias relativas mensuales indican cuatro rumbos preferentes cada mes. En general, los vientos más frecuentes soplan en el sector suroeste a norte, y los vientos del sector este a sureste son infrecuentes. Destacan los vientos que soplan en el sector norte a noreste en invierno y vientos del sector suroeste a oeste entre primavera a otoño. Los vientos septentrionales en febrero, vientos del suroeste en octubre y vientos ponientes en abril y mayo son dominantes. Vientos anabáticos o catabáticos no destacan, las intensidades de los vientos son elevadas, por tanto, este fenómeno no se desarrolla sobre el relieve con notoriedad.

- *Tabla 2. - La Orotava – Cumbre de Izaña, serie temporal 2007 – 2017*

La serie anemométrica no presenta ausencias. Serie temporal continua

	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
ENERO	31.4	36.0	29.7	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5
FEBRERO	36.4	26.4	34.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4
MARZO	31.5	22.0	42.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
ABRIL	24.7	22.4	42.6	2.5	2.6	1.7	2.0	1.4
MAYO	19.3	19.0	42.5	4.5	4.7	3.5	4.1	2.4
JUNIO	17.1	16.1	30.1	8.9	8.7	6.0	7.3	5.9
JULIO	12.8	14.0	17.3	13.1	13.9	9.3	10.5	8.7
AGOSTO	14.3	14.3	17.4	11.4	12.1	9.5	11.3	9.3
SEPTIEMBRE	17.7	17.1	27.1	8.4	9.6	6.4	7.4	6.2

OCTUBRE	22.8	19.2	41.9	3.4	3.6	2.8	3.5	2.7
NOVIEMBRE	26.3	29.0	39.8	0.9	1.1	0.8	1.0	1.0
DICIEMBRE	25.8	38.7	32.0	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7

Serie temporal anemométrica notable en la cumbre o alta montaña septentrional de la isla. Las cuantías de frecuencias mensuales indican tres rumbos preferentes cada mes. En general, los vientos más frecuentes soplan en el sector norte a este, y los vientos del sector sur a suroeste son infrecuentes. Destacan los vientos que soplan en el sector norte a este en invierno, primavera y otoño, también los vientos del sector sureste a sur en verano. Los vientos septentrionales en febrero, y vientos levantes en marzo, abril, mayo, octubre y noviembre son dominantes. Vientos anabáticos o catabáticos no se desarrollan por efecto orográfico.